令和７年５月29日　　予察情報７－５

病害虫防除技術情報　第２号

富山県農林水産総合技術センター所長

斑点米カメムシ類の多発について

１　発生状況

（１）令和７年５月 19～21 日において、水稲病害虫発生予察定点調査ほ場周辺の畦畔・雑草地ですくい取りによる調査を実施したところ、平年に比べ、確認地点率は 86.7%（平年 55.4%）と高く、捕獲頭数も 21.3 頭（平年 3.4 頭）と平成 10 年の調査開始以来、最も多く確認された（表）。

（２）特に、イネ科雑草が出穂している畦畔や雑草地で、カスミカメムシ類の生息密度が高い傾向があった。

２　防除対策

（１）今後、気温が高いと予想されていることから、斑点米カメムシ類がさらに増殖するおそれがある。このため、**畦畔や雑草地等ではイネ科雑草の穂が出穂しないように草刈りを徹底**する。

（２）アカスジカスミカメはノビエやホタルイの穂を好むので、**水田内の除草**に努める。

（３）大麦収穫後のほ場は、斑点米カメムシ類の繁殖好適地となるため、雑草が繁茂しないように管理するとともに、積極的に大豆や園芸作物、緑肥等を栽培する。

表　畦畔・雑草地における斑点米カメムシ類調査結果　　令和7年5月19～21日調査

	カスミカメムシ類				トゲシラホシカメムシ		合計（その他カメムシを含む）	
	アカスジカスミカメ		アカヒゲホソミドリカスミカメ					
	確認地点率（%）	調査地点平均頭数	確認地点率（%）	調査地点平均頭数	確認地点率（%）	調査地点平均頭数	確認地点率（%）	調査地点平均頭数
本年	86.7	17.8	33.3	3.1	8.9	0.1	86.7	21.3
前年	64.4	6.8	28.9	0.7	8.9	0.1	75.0	7.6
平年	33.2	2.2	28.0	1.1	4.4	0.0	55.4	3.4

※20回振りすくい取り調査結果、調査場所：水稲病害虫発生予察定点ほ（45か所）
※平年はH27～R6年の平均値

アカスジカスミカメ

ｱｶﾋｹﾞﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ

トゲシラホシカメムシ

問合せ先　　農業研究所　病理昆虫課
TEL076-429-2111　FAX076-429-2701