

富山湾漁況・海況概報

(NO. 7-7)

富山県農林水産総合技術センター
水産研究所：TEL (076) 475-0036

1. 令和7年9月の漁況

水産研究所が県下市場から収集した令和7年9月の県内の総漁獲量は1,193トンで、前年（1,019トン）をやや上回り、平年（過去10年平均：934トン）を上回った。

2. 9月の主な魚種別漁況（表1参照）

ツバイン・フクラギ：全市場合計漁獲量は793トンで平年（過去10年平均：191トン）をかなり上回った。市場別漁獲量は氷見437トン、新湊221トン、魚津73トン。

サバ：全市場合計漁獲量は143トンで平年（過去10年平均：72トン）をかなり上回った。市場別漁獲量は新湊53トン、氷見48トン、とやま市34トン。

シロエビ：全市場合計漁獲量は70トンで平年（過去10年平均：79トン）をやや下回った。市場別漁獲量とはやま市49トン、新湊21トン。

バショウカジキ：全市場合計漁獲量は42トンで平年（過去10年平均：10トン）をかなり上回った。市場別漁獲量は新湊34トン、氷見6トン、とやま市1トン。

シイラ：全市場合計漁獲量は34トンで平年（過去10年平均：195トン）をかなり下回った。市場別漁獲量は氷見23トン、新湊9トン、とやま市1トン。

ベニズワイ：全市場合計漁獲量は20トンで平年（過去10年平均：34トン）を下回った。市場別漁獲量は魚津12トン、新湊5トン、滑川2トン。

アジ：全市場合計漁獲量は13トンで平年（過去10年平均：69トン）をかなり下回った。市場別漁獲量は氷見6トン、新湊3トン、魚津3トン。

アオリイカ：全市場合計漁獲量は8トンで平年（過去10年平均：13トン）を下回った。市場別漁獲量は氷見4トン、新湊3トン、魚津1トン。

カマス：全市場合計漁獲量は7トンで平年（過去10年平均：77トン）をかなり下回った。市場別漁獲量は新湊3トン、氷見3トン、とやま市1トン。

表1 令和6年9月の主な魚種別漁獲量

(単位：トン)

魚 種	漁 法	令 和 7 年 9 月				前 年 月 計	前 月 月 計	平年比 (%)
		上旬	中旬	下旬	月計			
ツバイン・フクラギ	定	125	244	424	793	154	105	415
サバ	定	44	60	39	143	125	68	200
シロエビ	漁	29	25	15	70	29	52	88
バショウカジキ	定	0	4	37	42	6	0	408
シイラ	定	5	19	10	34	400	1	17
ベニズワイ	漁	0	9	11	20	23	0	60
アジ	定	3	5	6	13	34	10	20
アオリイカ	定	1	3	4	8	12	0	60
カマス	定	2	3	3	7	45	7	9
貝類	漁	2	1	2	5	5	28	63
小計		87	130	126	343	679	165	
その他		144	262	444	850	340	178	
合計		231	391	570	1,193	1,019	344	128

注：単位未満は四捨五入したため、月計と各旬の合計値が一致しない場合がある。

定：定置網、 漁：漁船漁業

※ 参考	かなり上(下)回る：+51%以上	上(下)回る：+50%～+21%
	やや上(下)回る：+20%～+6%	平年並み：+5%以内

3. 海洋観測結果

令和7年10月期の海洋観測を9月25日～26日に実施した。今回観測した水深別の湾内17定点の平均水温、これらの平年差、評価及び前月差は表2のとおりであった。また、観測域の表層、水深50m層、100m層および200m層における水温水平分布は図1のとおりであった。

観測定点の水温の範囲は、表層で26～27℃台、50m層で20～24℃台、100m層で11～17℃台、200m層で2～6℃台であった。なお、昨年同期の湾内17定点の平均水温との差は、表層で+1.11℃、50m層で+3.15℃、100m層で+0.77℃、200m層で-0.05℃であった。

水 深(m)	0	10	20	30	50	75	100	150	200	300
水 温 値	27.01	27.32	27.68	27.12	22.15	17.65	13.61	7.45	3.15	1.33
平 年 差	+3.08	+3.27	+3.72	+3.54	-0.80	-0.25	-1.37	-2.13	-1.44	-0.04
評 価	←-----→ はなはだ高い				←-----→ 平年並み		←-----→ やや低い	←-----→ かなり低い		←-----→ 平年並み
前 月 差	-1.78	-1.68	-1.17	-1.17	-3.71	-2.45	-2.61	-3.18	-2.60	-0.06

“平年並み” …約2年に1回の出現確率 “かなり高(低)い” …約10年に1回の出現確率
“やや高(低)い” …約4年に1回の出現確率 “はなはだ高(低)い” …約20年以上に1回の出現確率

図1 水温水平分布

